

平成28年度定期予防接種のお知らせ

おいらせ町が実施する定期予防接種は以下のとおりです。対象年齢内に忘れずに接種しましょう。

H28.10.1現在

種類	対象年齢 (*は標準的な接種年齢)	接種回数	備考	
★B型肝炎	1歳未満(生後2~8月)	27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種する。		
★ヒブ (インフルエンザb菌)	生後2~7月未満に開始 (*標準接種年齢)	27日以上(標準的には56日まで)の間隔をおいて3回接種し、3回終了後7月以上(標準的には13月まで)の間隔をおいて1回接種する。	初回2回目及び3回目の接種は生後12月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は行わないこと。(追加接種は実施可能)	
	生後2月~5歳未満 生後7~12月未満に開始	27日以上(標準的には56日まで)の間隔をおいて2回接種し、3回終了後7月以上(標準的には13月まで)の間隔をおいて1回接種する。	初回2回目の接種は生後12月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は行わないこと。(追加接種は実施可能)	
	1歳以上5歳未満に開始	1回接種する。		
★小児用肺炎球菌	生後2~7月未満に開始 (*標準接種年齢)	(標準的には12月までに)27日以上の間隔をおいて3回接種し、初回終了後60日以上の間隔をおいて生後12月以降に1回接種する。(標準接種期間は12月~15月)	初回2回目及び3回目の接種は生後24月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は行わないこと。(追加接種は実施可能) また、初回2回目の接種は生後12月に至るまでに行うこととしそれを越えた場合は、初回3回目の接種は行わないこと。(追加接種は実施可能)	
	生後2月~5歳未満 生後7~12月未満に開始	(標準的には生後12月までに)27日以上の間隔をおいて2回接種し、初回終了後60日以上の間隔をおいて生後12月以降に1回接種する。	初回2回目の接種は生後24月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は行わないこと。(追加接種は実施可能)	
	生後12月以上24月未満に開始	60日以上の間隔をあけて2回接種する。		
	2歳以上5歳未満	1回接種する。		
★四種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)	1期初回	生後3~90月未満(*生後3月~12月)	20日以上(標準的には56日まで)の間隔をおいて3回接種する。	
	1期追加	生後3~90月未満 (*初回接種終了後1年~1年半の間)	1期初回3回終了後、6月以上の間隔をおいて1回接種する。	
	2期(二種混合DT)	11歳以上13歳未満(*11歳~12歳:小6)	1回接種する。	個別通知あり
◆BCG(結核)	生後3月~1歳未満(*生後5月~8月)	1回接種する		
◆麻しん・風しん混合	1期	生後12月~24月未満	1回接種する	2期は個別通知あり。
	2期	小学校就学前の1年間		
◆水痘(水ぼうそう)	生後12月~36月未満 (*1回目の標準接種期間は12~15月)	3月以上の間隔(標準的には1回目の接種終了後6~12月の間隔をおいて)2回接種する。	*水痘にかかった方は定期予防接種の対象外です	
★日本脳炎	1期初回	生後6~90月未満(*3歳)	6日以上(標準的には28日まで)の間隔をおいて2回接種する。	積極的勧奨の対象である18歳の方には個別通知あり。 *平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方で、1期・2期の接種が終わっていない方は、20歳未満までの間に無料で接種を受けることができます。
	1期追加	生後6~90月未満(*4歳)	1期初回2回終了後、6月以上の間隔(標準的にはおおむね1年の間隔)をおいて1回接種する。	*平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方で、勧奨の差し控えにより接種できなかった1期の不足分を9~13歳未満の間に無料で受けることができます。
	2期	9歳以上13歳未満(*9歳~10歳:小4)	1回接種する。	
★不活化ポリオ (急性灰白髄炎)	初回	生後3~90月未満(*生後3月~12月)	20日以上の間隔をおいて3回接種する。	生ポリオワクチンの接種状況により回数が異なります。
	追加	生後3~90月未満(*生後12~18月)	1期初回3回終了後、6月以上の間隔をおいて1回接種する。	
★ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防)	2価 (サーバリックス®)	小6~高1相当の女子 (*中1相当年齢の者)	1月の間隔をおいて2回接種した後、初回1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種する。 ただし、当該方法をとることができない場合は1月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2年半以上の間隔をおいて1回接種する。	必ず同じワクチンを3回接種します。 ※現在、積極的勧奨を中止しておりますが、接種を受けるに当たっては有効性とリスクを理解した上で受けてください。
	4価 (ガーダシル®)		2月の間隔をおいて2回接種した後、初回1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種する。	

★印のワクチンは不活化ワクチンとなっていますので、別のワクチンを接種する場合は接種後6日以上間隔をあげましょう。(1週間後の同じ曜日から接種可能)

◆印のワクチンは生ワクチンとなっていますので、別のワクチンを接種する場合には接種後27日以上の間隔をあげましょう。(4週間後の同じ曜日から接種可能)

町内委託医療機関は裏面を参照してください。